



INSTITUTO DE OLHOS DE GOIÂNIA

Comissão de Residência Médica

Rua 9-B, nº 48, Setor Oeste, Goiânia,
Goiás CEP: 74110-120

Tel.: 62 3220-2500 / Fax: 62 3220-2560

E-mail: coreme@iog.net.br

RESIDÊNCIA MÉDICA ANO DE 2023 – INSTITUTO DE OLHOS DE GOIÂNIA

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS NO RESULTADO DA 1ª FASE

PROVA OBJETIVA

1. Recurso contra a questão de Conhecimentos: Clínica Médica

Questão 7

Parecer: Indererida.

Alternativa B: CORRETA. O eczema ou dermatite de estase tipicamente se apresenta com manchas ou placas eritematosas, descamativas e eczematosas nas pernas cronicamente edematosas. É uma manifestação tardia de insuficiência venosa crônica. Os corticoides tópicos são indicados no tratamento do eczema de estase de apresentação aguda.

2. Recurso contra a questão de Conhecimentos: Clínica Médica

Questão 8

Parecer: Indeferida.

Alternativa D: CORRETA. As neoplasias benignas do esôfago são menos comuns que as malignas. As mais prevalentes são leiomiomas, schwannomas, linfangiomas, hemangiomas, pólipos fibrovasculares, tumores de células granulares, adenomas, pólipos inflamatórios e fibroides, papilomas. O leiomioma é o tipo mais comum com incidência de 1:100.000 habitantes, acometendo mais homens que mulheres.

3. Recurso contra a questão de Conhecimentos: Cirurgia Geral

Questão 12

Parecer: Indeferida.

Alternativa C: CORRETA

Alternativa A: INCORRETA. É considerado PA grave quando Apache II maior ou igual a 8.

Alternativa B: INCORRETA. É PA grave quando Ranson maior ou igual a 3.

Alternativa D: INCORRETA: Edema não indica gravidade.

Alternativa E: INCORRETA: Falência orgânica com duração maior que 48 horas.

4. Recurso contra a questão de Conhecimentos: Cirurgia Geral

Questão 19

Parecer: Indeferida.

Alternativa A: INCORRETA. Fístulas pequenas podem ser tratadas conservadoramente aguardando seu fechamento espontâneo ou utilizar cola de fibrina por via broncoscópica.

Alternativas B, C e D: CORRETAS.

5. Recurso contra a questão de Conhecimentos: Ginecologia e Obstetrícia

Questão 21

Parecer: Indeferida.

Alternativa B: CORRETA. Técnica que contribui para tratar o problema e conservar a capacidade reprodutiva da mulher. O balão de Bakri é o principal componente dessa técnica. Trata-se de um balcão intrauterino que funciona como uma sonda descartável que, ao ser inflada com cerca de 500 ml de soro fisiológico, age como um tampão, bloqueando mecanicamente a perda sanguínea.

6. Recurso contra a questão de Conhecimentos: Ginecologia e Obstetrícia

Questão 22

Parecer: Indeferida.

Alternativa B: CORRETA. Epitélio colunar. O canal endocervical é recoberto pelo epitélio colunar (às vezes denominado epitélio glandular).

7. Recurso contra a questão de Conhecimentos: Ginecologia e Obstetrícia

Questão 24

Parecer: Indeferida.

Alternativa A: CORRETA. Na presença de aumento da resistência da artéria umbilical isoladamente, a vitalidade fetal deve ser reavaliada em uma semana. Se houver centralização fetal, a vigilância deve ser mais intensiva, a cada 72 horas. Nos casos de diástole zero ou reversa, a vigilância passa a ser diária.

8. Recurso contra a questão de Conhecimentos: Ginecologia e Obstetrícia

Questão 25

Parecer: Indeferida.

Alternativa D: CORRETA. Para identificar o tipo de amenorreia, o ginecologista normalmente indica exames laboratoriais para avaliar os níveis de hormônios circulantes no corpo, como estrogênio, progesterona, prolactina, TSH, FSH e LH, além de exames de imagem, como ultrassom transvaginal ou pélvico, para investigar se existem alterações anatômicas do sistema

re- produtor. Além disso, é importante fazer o teste para gravidez sempre que houver amenorreia, pois é possível engravidar mesmo em casos de ciclo menstrual irregular ou que estava ausente havia muito tempo.

9. Recurso contra a questão de Conhecimentos: Ginecologia e Obstetrícia

Questão 26

Parecer: Indererida.

Alternativa E: CORRETA. A associação de hipotireoidismo e puberdade precoce é pouco frequente e ocorre especialmente em situações graves não tratadas durante um longo período. A puberdade precoce periférica induzida por hipotireoidismo pode incluir telarca, galactorreia e menarca na ausência de pelo púbico.

10. Recurso contra a questão de Conhecimentos: Medicina Geral de Família e Comunidade

Questão 44

Parecer: Indererida.

Alternativa D: CORRETA. A clínica ampliada e compartilhada é a proposta de entender o significado do adoecimento e tratar a doença no contexto de vida, no qual esta doença se insere. No caso da alternativa D, todos os elementos se enquadram nesse contexto.

11. Recurso contra a questão de Conhecimentos: Medicina Geral de Família e Comunidade

Questão 46

Parecer: Indererida.

Alternativa A: CORRETA. A mediana é uma média de tendência central e sabemos que a média de permanência é o somatório do número de pacientes-dia / número de saídas. Logo, a mediana de idade dos pacientes implica o número de pacientes em relação à quantidade de saídas.

**Banca examinadora – Coreme - IOG
Instituto de Olhos de Goiânia**